稲作情報　　令和4年8月10日

ほ場で出穂期を確認し、刈取計画をたてましょう！

1　北陸地方1か月予報　（令和4年8月4日　新潟地方気象台発表）

・向こう1か月の平均気温は高い確率 70%です。

2　収穫適期のめやす

・積算温度による刈取適期のめやすは、**こしいぶきが975℃、コシヒカリが1000℃**です。
・今後の気温が平年よりも高温で推移した場合は、収穫日を2日程度早めましょう。
・下記表を参考に収穫適期を把握し、早めに作業計画をたてましょう。

（8月7日現在）

品種（地域）	移植日	出穂期	収穫期予想	
			平年並で推移	高温で推移
こしいぶき（平坦地）	5月15日	7月25日	9月1日	8月30日
コシヒカリ（平坦地）	5月15日	8月4日	9月14日	9月11日
	5月20日	8月7日	9月17日	9月15日
	5月25日	8月10日	9月21日	9月19日
コシヒカリ（山間地）	5月15日	8月7日	9月20日	9月17日
	5月20日	8月10日	9月24日	9月21日
	5月25日	8月12日	9月27日	9月24日

※平坦地は小出アメダス地点、山間地は守門アメダス地点のデータを基に試算

（今後更新される積算温度表は、JA営農センター、普及センターのホームページ等で入手できます）

不明な点はJA営農センターまたは普及センターにおたずねください。携帯メール会員募集！営農センターへお問い合わせください。

JA北魚沼・魚沼農業普及指導センター