R4　積算気温による刈取適期予想（平坦地）

9月26日 現在

9月26日　までの気温は本年の小出アメダスデータ値、　9月27日 以降の気温は過去10年の平均値により算出

JA北魚沼・魚沼農業普及指導センター

積算気温による刈取適期予想

出穂期		9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11
コシヒカリ	8/3	957	981	1006	1032	1057	1080	1104	1129	1155	1184	1203	1219	1237	1257	1277	1297	1318	1338	1356	1375	1395	1414	1434	1453	1471	1489	1507	1525	1543	1561	1579	1597
	8/4	933	957	982	1008	1033	1056	1080	1105	1131	1160	1179	1195	1213	1233	1253	1273	1294	1314	1332	1351	1371	1390	1410	1429	1447	1465	1483	1501	1519	1537	1555	1573
	8/5	906	930	956	981	1006	1029	1054	1079	1104	1134	1153	1169	1186	1206	1226	1246	1268	1287	1306	1325	1344	1363	1383	1402	1421	1439	1456	1474	1492	1510	1528	1546
	8/6	879	903	928	954	979	1002	1027	1052	1077	1106	1125	1141	1159	1179	1199	1219	1241	1260	1279	1297	1317	1336	1356	1375	1393	1411	1429	1447	1465	1483	1501	1519
いただき	8/7	851	875	900	926	951	974	998	1023	1049	1078	1097	1113	1131	1151	1171	1191	1212	1232	1250	1269	1289	1308	1328	1347	1365	1383	1401	1419	1437	1455	1473	1491
	8/8	822	846	871	897	922	945	970	995	1020	1050	1068	1085	1102	1122	1142	1										1354	1372	1390	1408	1426	1444	1462
	8/9	794	818	844	869	894	917	942	967	992	1022	1041	1057	1074	1094	111											1327	1344	1362	1380	1398	1416	1434
	8/10	766	790	816	841	866	889	914	939	964	994	1013	1029	1046	1066	1086	1106	1128	1147	1166	1185	1204	1223	1243	1262	1281	1299	1316	1334	1352	1370	1388	1406
	8/11	738	762	787	813	838	861	886	911	936	966	984	1001	1018	1038	1058	1078	1100	1119	1138	1157	1176	1195	1215	1234	1252	1271	1288	1306	1324	1342	1360	1378
新之助 あきだわら 越淡麗	8/12	711	735	760	786	811	834	858	883	909	938	957	973	991	1011	1031	1051	1072	1092	1111	1129	1149	1168	1188	1207	1225	1243	1261	1279	1297	1315	1333	1351
	8/13	682	707	732	757	782	805	830	855	881	910	929	945	962	982	1002	1022	1044	1063	1082	1101	1120	1140	1159	1178	1197	1215	1233	1250	1268	1286	1304	1322
	8/14													936	956	976	996	1018	1037	1056	1075	1094	1113	1133	1152	1171	1189	1206	1224	1242	1260	1278	1296
	8/15													910	930	950	970	992	1011	1030	1049	1068	1087	1107	1126	1145	1163	1180	1198	1216	1234	1252	1270
	8/16													885	905	925	945	966	986	1004	1023	1043	1062	1082	1101	1119	1137	1155	1173	1191	1209	1227	1245
	8/17													861	881	901	921	943	962	981	1000	1019	1038	1058	1077	1095	1113	1131	1149	1167	1185	1203	1221
	8/18													838	858	878	898	919	939	957	976	996	1015	1035	1054	1072	1090	1108	1126	1144	1162	1180	1198
	8/19													814	834	854	873	895	915	933	952	972	991	1010	1030	1048	1066	1084	1102	1120	1138	1156	1174
	8/20													791	811	831	851	873	892	911	930	949	968	988	1007	1025	1043	1061	1079	1097	1115	1133	1151

胴割粒発生の危険が高まっているので、
早めに籾の黄化率を確認し、
できる限り速やかに収穫しましょう。

出穂後積算気温の目安

品種	高温に遭遇した場合	通常の場合
コシヒカリ いただき 越淡麗 こがねもち	50℃早めます 950～1,000℃ ←	1,000～1,050℃
新之助 あきだわら	50℃早めます 1,000～1,050℃ ←	1,050～1,100℃

※ 刈取適期に収穫作業のピークとなる計画を立てましょう。

※ 最終的な収穫適期の判断は、穂の黄化率から判断しましょう。（通常年の収穫適期は、穂の黄化率85～90%）