R4　積算気温による刈取適期予想（山間地）

9月26日 現在

9月26日 までの気温は本年の守門アメダスデータ値、 9月27日 以降の気温は過去10年の平均値により算出

JA北魚沼・魚沼農業普及指導センター

積算気温による刈取適期予想

出穂期		9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11
コシヒカリ	8/2	961	985	1009	1032	1054	1077	1100	1125	1153	1171	1185	1202	1222	1241	1260	1280	1299	1317	1334	1352	1370	1388	1406	1423	1440	1455	1470	1485	1503	1520	1537
	8/3	936	960	984	1007	1029	1052	1076	1101	1128	1146	1160	1177	1197	1217	1235	1256	1274	1292	1309	1327	1345	1364	1382	1399	1415	1431	1445	1461	1478	1495	1512
	8/4	913	937	961	984	1006	1029	1052	1077	1105	1123	1137	1154	1174	1193	1212	1232	1251	1269	1286	1304	1322	1340	1358	1375	1392	1407	1422	1437	1455	1472	1489
	8/5	889	912	936	959	982	1005	1028	1053	1081	1098	1113	1130	1150	1169	1188	1208	1226	1244	1262	1280	1298	1316	1334	1351	1368	1383	1398	1413	1430	1447	1464
	8/6	862	886	910	933	956	979	1002	1027	1055	1072	1087	1104	1124	1143	1162	1182	1200	1218	1236	1254	1272	1290	1308	1325	1342	1357	1372	1387	1404	1421	1438
	8/7	836	859	884	907	929	952	975	1000	1028	1045	1060	1077	1097	1116	1135	1155	1174	1191	1209	1227	1245	1263	1281	1298	1315	1330	1345	1360	1377	1394	1412
	8/8	808	832	856	879	901	925	948	973	1001	1018	1033	1049	1069	1089	1107	1128	11										1317	1333	1350	1367	1384
いただき	8/9	781	805	829	852	875	898	921	946	974	991	1006	1023	1043	1062	1081	1101	11										1291	1306	1323	1340	1357
	8/10	755	779	803	826	848	871	894	919	947	965	979	996	1016	1035	1054	1074	1095										1264	1279	1297	1314	1331
	8/11	728	752	776	799	821	844	867	892	920	938	952	969	989	1008	1027	1047	1066	1084	1101	1119	1137	1155	1173	1190	1207	1222	1237	1252	1270	1287	1304
	8/12	702	725	749	772	795	818	841	866	894	911	926	943	963	982	1001	1021	1039	1057	1075	1093	1111	1129	1147	1164	1181	1196	1211	1226	1243	1260	1277
	8/13	674	698	722	745	767	791	814	839	867	884	899	916	936	955	974	994	1012	1030	1048	1066	1084	1102	1120	1137	1154	1169	1183	1199	1216	1233	1250
	8/14	649	673	697	720	742	766	789	814	842	859	874	890	910	930	948	969	987	1005	1022	1041	1059	1077	1095	1112	1129	1144	1158	1174	1191	1208	1225
	8/15	624	648	672	695	718	741	764	789	817	834	849	866	886	905	924	944	962	980	998	1016	1034	1052	1070	1087	1104	1119	1134	1149	1166	1183	1200
	8/16																	9	938	955	973	991	1009	1027	1045	1062	1079	1094	1109	1124	1141	1159	1176
	8/17																	6	915	933	950	968	986	1005	1022	1039	1056	1072	1086	1101	1119	1136	1153
	8/18																	4	892	910	928	946	964	982	1000	1017	1034	1049	1064	1079	1096	1113	1130
	8/19																	1	870	888	905	923	941	960	977	994	1011	1027	1041	1056	1074	1091	1108
	8/20	611	634	658	681	704	727	750	775	803	820	835	852	872	891	910	930	848	866	884	902	920	938	956	973	990	1005	1020	1035	1052	1069	1086

胴割粒発生の危険が高まっているので、
早めに籾の黄化率を確認し、
できる限り速やかに収穫しましょう。

出穂後積算気温の目安

品種	高温に遭遇した場合	通常の場合
コシヒカリ いただき	50℃早めます 950～1000℃ ←	1000～1,050℃

※ 刈取適期に収穫作業のピークとなる計画を立てましょう。

※ 最終的な収穫適期の判断は、穂の黄化率から判断しましょう。（通常年の収穫適期は、穂の黄化率85～90%）