稲作速報 No. 1

令和６年５月 30 日

【発行者】新潟農業普及指導センター
新津庁舎：0250-24-9626、津川分室：0254-92-

**異常気象を意識したコンパクトで丈夫な稲づくり**

# 連休植えは生育旺盛！１か月後に中干し開始！

## １ 生育調査結果（５月 30 日調査）

各品種の茎数は指標値比で、コシヒカリ「やや少」、こしいぶき「多」となっているものの、ほ場間差が大きい。一方で連休植えは生育旺盛なほ場が多い。

| 品種 | | 草丈（cm） | 茎数（本/㎡） | 葉数（葉） |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ（調査点数９） | 本年値平均 | 25 | 90 | 4.8 |
| | 指標値比･差 | 96% | 94% | −0.5 |
| こしいぶき（調査点数５） | 本年値平均 | 24 | 142 | 5.5 |
| | 指標値比･差 | 98% | 118% | +0.2 |

**あっという間に茎数が増えます！**
**油断せず茎数を確認しましょう**

## ２ 今後の天気（６月１日～６月 30 日：新潟地方気象台５/30 発表）

【確率の高い予報（平年比）】 気温：ほぼ平年並　降水量：ほぼ平年並　日照時間：ほぼ平年並

## ３ 今後の栽培管理

（１）連休植えのほ場は田植え 25 日後に**茎数を確認し、遅れず中干しを開始する。**
（２）ワキ、表層剥離等が見られるほ場は、**夜間落水や水更新**を行い、分げつの発生を促す。
（３）溝切りの溝は、**末端は必ず水口、水尻に繋げる。**
（４）いもち病の発生源になるため、**補植苗は直ちに除去**する。

表　品種別中干し開始めやすの茎数

| 品種 | 目標穂数（本/m²） | めやすの茎数（本/m²） | めやすの茎数（本/株） 50 株植え | めやすの茎数（本/株） 60 株植え |
|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ | 350 | **245** | 16 | 14 |
| こしいぶき新之助 | 400 | **280** | 18 | 15 |

中干し適期は条間が、葉で重なり合う前

## ４ 「新之助」栽培のポイント

（１）**茎数が増えやすい品種**のため、**田植え 25 日後頃に茎数を確認**し、遅れずに中干しを開始する。
（２）葉いもちの予防防除を未実施の場合は、６月 10 日までに予防粒剤を施用する。

平均茎数約18本の様子




株毎に茎数が違うので、必ず数株を数える

詳しい技術情報については、稲作技術情報もご覧ください。