

# 上越地域「新之助」生育速報 No.2

令和7年6月10日  
上越農業普及指導センター

## 茎数を確認し遅れずに中干しを！

### 1 生育概況

- 5月15日頃移植の平坦地では、ほぼ指標並に茎数が増加しています。
- ワキや表層剥離が全体的に発生しており、ワキが多発しているほ場では下葉の黄化が確認されています。

調査場所		田植日	草丈 (cm)	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	葉数 (葉)	葉色 (SPAD)
<平坦地指標>			28	220	7.0	36.0
上越市下稻塚	平坦地	5月16日	28	199	6.5	37.7
大潟区吉崎	平坦地	5月15日	28	219	6.6	33.0
<中山間指標>			33	230	7.5	36.0
安塚区坊金	中山間	5月27日	26	65	5.8	28.6

そろそろ中干し時期！  
移植から25日後をめやすに  
茎数を確認しましょう！



写真 上越市下稻塚ほ場の現在の様子

### 2 今後の管理

- コシヒカリに比べて茎数増加が早いので、茎数が目標穂数の7～8割(50株植えて1株当たり18本)になったら確実に中干しを開始してください。
- 梅雨入りにより雨が続くと中干し効果が発揮されにくいので、遅くとも移植30日後には中干しを開始してください。
- ワキや表層剥離の見られるほ場では、早めに中干しを開始しましょう。
- 中干し効果を促進するとともに、中干し後の水管理を容易にするため、溝切りは必ず実施して、末端は排水口につないでください。