

令和8年5月14日  
 福祉保健部感染症対策・薬務課

 新潟県感染症情報（週報速報版）をお知らせします  
 （令和8年第19週：令和8年5月4日から令和8年5月10日まで）

※新潟県感染症情報は「速報版」であり、前週公表した数値と異なる場合があります。

**◆麻しん（はしか）に注意をお願いします。（別紙1参照）**

- 第10週（3/2～3/8）以降の県内での発生はありませんが、全国的には直近10年で最も感染者数の多かった2019年の同時期に迫る勢いで急増しています。麻しん（はしか）は、マスクや手洗いでは感染予防として十分でなく、ワクチンが重要です。**麻しん（はしか）は、先進国でも重症化することもあり、1,000人に1人死亡するとされている感染症**です。
- 発熱、発しんなどの麻しん（はしか）を疑う症状がある場合は、**外出を控えるとともに、受診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従ってご対応いただくよう**お願いします。また、受診の際には、**公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。**
- ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、麻しん・風しんワクチンの2回接種が重要です。お子様が**定期接種の対象である1歳又は就学前1年間**にある場合、**積極的に早期の接種をご検討**ください。
- また、ご自身やご家族の予防接種歴について確認をお願いします。2回の接種記録を確認できない場合は、必要に応じて医療機関にご相談ください。

 ※厚生労働省「麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ」（別紙2参照）  
[麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について - 新潟県ホームページ](https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html)  
<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356868039539.html>
**◆つつが虫病の届出がありました。（別紙3参照）**

- 県内において、今年初のつつが虫病の届出がありました。
- ダニの一種であるツツガムシに刺されることによって感染します。春～初夏及び秋～初冬に2つの発生ピークがあります。人から人へ感染することはありません。
- 野外作業、山菜採り、アウトドアレジャーなどで山林や草地などに入るときは、長袖、長ズボン、長靴を着用し、肌をできるだけ出さないようにしたり、防虫スプレーを使用するなどの対策をとりましょう。

[つつが虫病に注意しましょう - 新潟県ホームページ](https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356900210916.html)
<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/1356900210916.html>

 ●今週の  
 トピック

## ●定点報告

全県に警報を発令している疾病：なし

## ●全数報告

|       |             |    |          |           |        |
|-------|-------------|----|----------|-----------|--------|
| 1類感染症 | 届出なし        |    |          |           |        |
| 2類感染症 | 届出なし        |    |          |           |        |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1件 | 新潟市保健所管内 | 無症状病原体保有者 | 10歳代男性 |
|       | E型肝炎        | 1件 | 新潟市保健所管内 | 患者        | 60歳代男性 |
|       | A型肝炎        | 1件 | 新潟市保健所管内 | 患者        | 60歳代男性 |
| 4類感染症 | つつが虫病       | 1件 | 十日町保健所管内 | 患者        | 80歳代女性 |
|       | レジオネラ症      | 1件 | 新潟市保健所管内 | 患者        | 50歳代男性 |

5類感染症

|            |    |          |           |        |
|------------|----|----------|-----------|--------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1件 | 南魚沼保健所管  | 患者        | 60歳代女性 |
| 梅毒         | 1件 | 新発田保健所管内 | 無症状病原体保有者 | 50歳代女性 |

次回は令和8年5月21日（木）発行予定です。

福祉保健部感染症対策・薬務課感染症対策班  
電話 025-280-5200（内線 2594）

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)地域振興局等管内別報告数

令和8年第19週:5月4日から5月10日まで

|                   |     | 県計   | 新潟市  | 新発田  | 新津※ | 三条   | 長岡   | 魚沼   | 南魚沼  | 十日町  | 柏崎   | 糸魚川  | 村上   | 佐渡   | 上越   |
|-------------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ           | 実数  | 16   | 4    | 1    |     | 4    |      |      | 2    | 1    |      |      |      | 1    | 3    |
|                   | 定点当 | 0.29 | 0.22 | 0.25 |     | 0.80 |      |      | 0.67 | 0.50 |      |      |      | 0.50 | 0.75 |
| 新型コロナウイルス感染症      | 実数  | 39   | 9    | 1    |     | 9    | 5    |      |      | 3    | 3    | 1    |      | 8    |      |
|                   | 定点当 | 0.71 | 0.50 | 0.25 |     | 1.80 | 0.71 |      |      | 1.50 | 1.50 | 0.50 |      | 4.00 |      |
| RSウイルス感染症         | 実数  | 7    | 2    |      |     | 2    | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
|                   | 定点当 | 0.23 | 0.20 |      |     | 0.67 | 0.50 |      |      |      |      |      |      |      | 0.50 |
| 咽頭結膜熱             | 実数  | 6    |      |      |     | 4    | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.20 |      |      |     | 1.33 | 0.50 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 実数  | 63   | 8    | 2    |     | 12   | 26   | 2    |      |      |      | 1    | 6    | 1    | 5    |
|                   | 定点当 | 2.10 | 0.80 | 1.00 |     | 4.00 | 6.50 | 2.00 |      |      |      | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 2.50 |
| 感染性胃腸炎            | 実数  | 79   | 25   | 2    |     | 11   | 21   | 4    |      |      |      | 6    |      | 7    | 3    |
|                   | 定点当 | 2.63 | 2.50 | 1.00 |     | 3.67 | 5.25 | 4.00 |      |      |      | 6.00 |      | 7.00 | 1.50 |
| 水痘                | 実数  | 7    |      |      |     | 2    | 4    |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
|                   | 定点当 | 0.23 |      |      |     | 0.67 | 1.00 |      |      |      |      |      |      | 1.00 |      |
| 手足口病              | 実数  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 伝染性紅斑             | 実数  | 7    | 1    |      |     | 5    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
|                   | 定点当 | 0.23 | 0.10 |      |     | 1.67 |      |      |      |      |      |      |      | 1.00 |      |
| 突発性発疹             | 実数  | 4    |      | 1    |     | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
|                   | 定点当 | 0.13 |      | 0.50 |     | 0.33 | 0.25 |      |      |      |      |      |      |      | 0.50 |
| ヘルパンギーナ           | 実数  | 1    |      |      |     | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.03 |      |      |     | 0.33 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 流行性耳下腺炎           | 実数  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 急性出血性結膜炎          | 実数  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 流行性角結膜炎           | 実数  | 17   |      | 1    |     | 1    | 15   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 1.70 |      | 1.00 |     | 1.00 | 7.50 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 細菌性髄膜炎            | 実数  | 2    |      | 2    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.15 |      | 2.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 無菌性髄膜炎            | 実数  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| マイコプラズマ肺炎         | 実数  | 1    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
|                   | 定点当 | 0.08 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | 1.00 |      |      |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)  | 実数  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 実数  | 1    |      |      |     |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.08 |      |      |     |      |      |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      |

|          |     | 県計    | 新潟市   | 新発田   | 新津※  | 三条    | 長岡    | 魚沼    | 南魚沼   | 十日町   | 柏崎    | 糸魚川   | 村上    | 佐渡    | 上越    |
|----------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性呼吸器感染症 | 実数  | 1919  | 784   | 76    | 8    | 283   | 239   | 64    | 44    | 83    | 95    | 88    | 12    | 74    | 69    |
|          | 定点当 | 36.90 | 43.56 | 19.00 | 4.00 | 56.60 | 47.80 | 32.00 | 14.67 | 27.67 | 47.50 | 44.00 | 12.00 | 37.00 | 23.00 |

※新津は、新潟地域振興局管内(五泉市、阿賀町)

実数:指定届出機関(定点医療機関)からの患者報告の総数

定点当:実数を指定届出機関(定点医療機関)の総数で除したもの

5類感染症定点把握対象疾患(週報届出分)最近6週間の推移

|              |     | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ      | 実数  | 325  | 121  | 104  | 59   | 30   | 16   |
|              | 定点当 | 5.91 | 2.20 | 1.89 | 1.07 | 0.55 | 0.29 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 実数  | 43   | 40   | 48   | 52   | 46   | 39   |
|              | 定点当 | 0.78 | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 0.84 | 0.71 |

|                   |     | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| RSウイルス感染症         | 実数  | 14   | 16   | 20   | 25   | 11   | 7    |
|                   | 定点当 | 0.47 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 0.37 | 0.23 |
| 咽頭結膜熱             | 実数  | 7    | 8    | 4    | 7    | 5    | 6    |
|                   | 定点当 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 実数  | 69   | 93   | 140  | 154  | 172  | 63   |
|                   | 定点当 | 2.30 | 3.10 | 4.67 | 5.13 | 5.73 | 2.10 |
| 感染性胃腸炎            | 実数  | 94   | 94   | 144  | 126  | 152  | 79   |
|                   | 定点当 | 3.13 | 3.13 | 4.80 | 4.20 | 5.07 | 2.63 |
| 水痘                | 実数  | 8    | 3    | 25   | 9    | 15   | 7    |
|                   | 定点当 | 0.27 | 0.10 | 0.83 | 0.30 | 0.50 | 0.23 |
| 手足口病              | 実数  | 2    | 1    |      |      | 5    |      |
|                   | 定点当 | 0.07 | 0.03 |      |      | 0.17 |      |
| 伝染性紅斑             | 実数  | 6    | 11   | 11   | 11   | 13   | 7    |
|                   | 定点当 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.23 |
| 突発性発疹             | 実数  | 5    | 12   | 3    | 2    | 7    | 4    |
|                   | 定点当 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.13 |
| ヘルパンギーナ           | 実数  | 1    |      | 1    |      | 1    | 1    |
|                   | 定点当 | 0.03 |      | 0.03 |      | 0.03 | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎           | 実数  | 1    |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 | 0.03 |      |      |      |      |      |
| 急性出血性結膜炎          | 実数  | 1    | 2    | 1    |      | 2    |      |
|                   | 定点当 | 0.11 | 0.22 | 0.11 |      | 0.20 |      |
| 流行性角結膜炎           | 実数  |      |      | 1    | 4    | 13   | 17   |
|                   | 定点当 |      |      | 0.11 | 0.40 | 1.30 | 1.70 |
| 細菌性髄膜炎            | 実数  |      | 1    |      | 1    | 2    | 2    |
|                   | 定点当 |      | 0.08 |      | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 無菌性髄膜炎            | 実数  |      |      |      |      |      |      |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |      |      |
| マイコプラズマ肺炎         | 実数  | 2    | 8    | 4    | 3    | 4    | 1    |
|                   | 定点当 | 0.15 | 0.62 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.08 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く)  | 実数  |      |      | 1    |      | 1    |      |
|                   | 定点当 |      |      | 0.08 |      | 0.08 |      |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 実数  |      |      |      |      |      | 1    |
|                   | 定点当 |      |      |      |      |      | 0.08 |

|          |     | 5週前   | 4週前   | 3週前   | 2週前   | 1週前   | 今週    |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性呼吸器感染症 | 実数  | 2547  | 2469  | 2788  | 3005  | 3232  | 1919  |
|          | 定点当 | 48.98 | 47.48 | 53.62 | 57.79 | 62.15 | 36.90 |

入院サーベイランス

|              |     | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ      | 実数  | 5    | 1    |      |      | 4    |      |
|              | 定点当 | 0.38 | 0.08 |      |      | 0.31 |      |
| 新型コロナウイルス感染症 | 実数  | 17   | 8    | 4    | 6    | 4    | 3    |
|              | 定点当 | 1.31 | 0.62 | 0.31 | 0.46 | 0.31 | 0.23 |

令和8年第19週:5月4日から5月10日まで

| 年齢別 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~59歳 | 60歳以上 |
|-----|----|------|------|--------|--------|--------|-------|
|     |    | 3    | 4    | 4      |        | 3      | 2     |
|     |    | 0.06 | 0.07 | 0.07   |        | 0.06   | 0.04  |
|     |    | 6    | 8    | 4      |        | 12     | 9     |
|     |    | 0.12 | 0.16 | 0.07   |        | 0.21   | 0.16  |

| 年齢別 | 0歳   | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|-----|------|------|------|--------|--------|-------|
|     | 3    | 4    |      |        |        |       |
|     | 0.10 | 0.14 |      |        |        |       |
|     |      | 3    | 3    |        |        |       |
|     |      | 0.10 | 0.10 |        |        |       |
|     | 1    | 15   | 30   | 12     | 2      | 3     |
|     | 0.03 | 0.50 | 1.00 | 0.40   | 0.07   | 0.10  |
|     | 7    | 38   | 24   | 6      | 1      | 3     |
|     | 0.23 | 1.26 | 0.80 | 0.20   | 0.03   | 0.10  |
|     |      | 1    | 3    | 3      |        |       |
|     |      | 0.03 | 0.10 | 0.10   |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      | 2    | 4    | 1      |        |       |
|     |      | 0.06 | 0.13 | 0.03   |        |       |
|     | 1    | 3    |      |        |        |       |
|     | 0.03 | 0.10 |      |        |        |       |
|     |      | 1    |      |        |        |       |
|     |      | 0.03 |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        | 17    |
|     |      |      |      |        |        | 1.70  |
|     |      |      |      |        |        | 2     |
|     |      |      |      |        |        | 0.16  |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        | 1     |
|     |      |      |      |        |        | 0.08  |
|     |      |      |      |        |        |       |
|     |      | 1    |      |        |        |       |
|     |      | 0.08 |      |        |        |       |

| 年齢別 | 0歳   | 1~4歳  | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~59歳 | 60歳以上 |
|-----|------|-------|------|--------|--------|--------|-------|
|     | 122  | 652   | 361  | 175    | 67     | 343    | 199   |
|     | 2.35 | 12.54 | 6.94 | 3.37   | 1.29   | 6.60   | 3.83  |

| 年齢別 | 0歳   | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~59歳 | 60歳以上 |
|-----|------|------|------|--------|--------|--------|-------|
|     |      |      |      |        |        |        |       |
|     |      |      |      |        |        |        |       |
|     | 1    | 1    |      |        |        |        | 1     |
|     | 0.08 | 0.08 |      |        |        |        | 0.08  |

指定届出機関(定点医療機関)から報告の修正等があった場合、前週の感染症情報(週報速報版)で公表した数値と異なる場合があります。

保健所・疾患・施設種別 感染症集団発生等報告数(第19週)

令和8年5月4日～令和8年5月10日

| インフルエンザ                                | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|--|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

| 新型コロナウイルス感染症                           | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|--|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

| 感染性胃腸炎                                 | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|--|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

| その他の感染症                                | 新潟市 | 村上 | 新発田 | 新津 | 三条 | 長岡 | 魚沼 | 南魚沼 | 柏崎 | 十日町 | 上越 | 糸魚川 | 佐渡 |
|--|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 児童福祉施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    | 1   |    | 1   |    |     |    |
| 老人福祉施設(施設数)                            |     | 1  |     |    |    |    |    |     |    | 1   |    |     |    |
| 障害福祉サービス事業所／<br>身体障害者社会参加支援施設<br>(施設数) |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 保護施設(施設数)                              |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |
| その他の施設(施設数)                            |     |    |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |

※その他の感染症:ヒトメタニューモウイルス、RSウイルス、風邪様症状

○ 報告の要件

- ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

所在地 [トップページ](#) > [組織でさがす](#) > [福祉保健部](#) [感染症対策・薬務課](#) > 麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について

## 麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起について

ページ番号：0379346 更新日：2026年5月14日更新

### 麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ（厚生労働省より）

○ 重症になりやすく、感染力が極めて高い麻しん（はしか）が、2020年以降最多となるペースで感染拡大しています。麻しん（はしか）は、マスクや手洗いでは感染予防として十分ではなく、ワクチンが重要です。麻しん（はしか）は、「かかってみたいことはない」感染症ではなく、肺炎・脳炎・腸炎などで重症化することも多く、先進国でも重症化することもあり、1,000人に1人死亡するとされている感染症です。更なる感染拡大防止のため、以下の事項について、ご協力をお願いいたします。

#### <麻しん（はしか）を疑う症状がある場合の対応>

- 麻しんを疑う症状がある場合は、外出を控えるとともに、受診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従ってご対応いただくようお願いいたします。
- 感染拡大防止のため、受診の際には、公共交通機関の利用を可能な限り避けることについて、ご協力をお願いいたします。

#### <自治体の疫学調査へのご協力>

- 麻しん（はしか）の感染拡大防止には、患者や接触者に対する行政による調査が重要です。ご協力をお願いいたします。

#### <ワクチン接種のご検討>

- ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、ワクチンは2回接種することが重要です。
- お子様か麻しん・風しんワクチンの定期接種の対象である1歳又は就学前1年間にいる場合、積極的に早期の接種をご検討ください。
- 海外では大きな流行が複数の国で報告されています。接種が不十分な場合、渡航の2週間前までに接種することをご検討ください。
- 2000年4月1日以前に生まれた方は、当時の感染状況もあり、2回の定期接種が行われていない可能性があります。母子健康手帳等で、過去の麻しんの罹患歴又は2回の接種記録を確認できない方は、今一度、麻しん・風しんワクチンの接種をご検討ください。なお、今回の流行は10代～40代の方を中心に流行していることも踏まえ、特にこの年齢層の方はご検討をお願いいたします。

#### <特にご注意ください方々>

- 特に、以下の方々は、接種が不十分な場合、ワクチンの接種をご検討ください。
  - ・ 保育園や学校職員、医療機関職員など、小さいお子さんや患者さんと接触する機会の多い方
  - ・ 空港職員、観光業スタッフなど渡航者と接触する機会の多い方
- また、以下の方々は、感染すると重症化するとされていますのでご注意ください。
  - ・ 妊娠中は麻しん風しんワクチンの接種はできません。早産や流産のリスクがあるため、妊娠前の接種をご検討ください。
  - ・ 免疫不全のある方は、主治医の方と相談のうえ、麻しん風しんワクチン接種をご検討ください。
  - ・ 乳幼児は、肺炎や脳炎を起こすリスクがありますので、ご家族の接種歴をご確認ください。

[麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ（厚生労働省）](#) [PDFファイル/448KB]

参考：[麻しん（はしか）にご注意ください（厚生労働省）](#) [PDFファイル/343KB]

### 麻しんの国内外での報告増加に伴う注意喚起について

厚生労働省より、麻しん（はしか）の国内外での報告増加に伴う注意喚起が発表されています。

現在、海外における流行が報告されており、インドネシアをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しています。今後、輸入事例の更なる増加や、国内における感染伝播事例が増加することが懸念されることから、海外渡航をされる方は、以下の点に注意をお願いします。

#### 【海外渡航前の注意事項】


- ・ ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認すること。
- ・ 母子保健手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認すること。
- ・ 過去定期接種を実施した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討すること。
- ・ 麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討すること。

#### 【麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項】

- ・ 渡航後、帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること。
- ・ 発熱や咳そう、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関に対して事前に、麻しんの流行がみられる地域に渡航していたことや、麻しんの可能性について連絡の上、受診すること。
- ・ 医療機関を受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通機関を用いることなく受診すること。

<厚生労働省リーフレット>

見つからないときは



海外へ渡航される方へ

# 「麻しん（はしか）」は 世界で流行している感染症です。

麻しん報告数上位100国々

| 国名      | 報告数    |
|---------|--------|
| インドネシア  | 14,806 |
| インド     | 9,277  |
| ネパール    | 8,983  |
| パキスタン   | 8,310  |
| アフガニスタン | 8,184  |
| フィリピン   | 5,913  |
| ナイジェリア  | 4,676  |
| ベトナム    | 3,334  |
| ロシア連邦   | 2,939  |
| ウズベキスタン | 2,859  |

日本国内で報告された麻しん症例の確定感染地域

海外へ行く前に

- 麻しんの予防接種歴を母子手帳などで確認しましょう
- 定期接種を受けていない方は、接種を検討してください

厚生労働省

[出国前の注意事項 \[PDFファイル/421KB\]](#)

海外から帰国された方へ

# 帰国後2週間程度は 麻しん 発症の可能性を考慮し 健康状態に注意してください。

麻しん報告数上位100国々

| 国名      | 報告数    |
|---------|--------|
| インドネシア  | 14,806 |
| インド     | 9,277  |
| ネパール    | 8,983  |
| パキスタン   | 8,310  |
| アフガニスタン | 8,184  |
| フィリピン   | 5,913  |
| ナイジェリア  | 4,676  |
| ベトナム    | 3,334  |
| ロシア連邦   | 2,939  |
| ウズベキスタン | 2,859  |

日本国内で報告された麻しん症例の確定感染地域

帰国後2週間程度は

- 高熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状に注意しましょう

厚生労働省

[帰国後の注意事項 \[PDFファイル/457KB\]](#)

[参考：麻しんにご注意ください（厚生労働省リーフレット） \[PDFファイル/440KB\]](#)

<海外渡航に関する参考資料>

- [海外における麻しん（はしか）に関する注意喚起（厚生労働省検疫所）](#) <外部リンク>
- [外務省海外安全ホームページ](#) <外部リンク>
- [外務省たびレジ](#) <外部リンク>

発生状況

[麻しん（はしか）の発生状況（感染症発生動向調査（Idwr）：国立健康危機管理研究機構）](#) <外部リンク>

新潟県内の患者発生状況（人）

|        | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 新潟県内   | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 10    |
| （参考）全国 | 744   | 10    | 6     | 6     | 28    | 45    | 265   | 462   |

※2026年については、新潟県内は第19週（5月10日）まで、全国は第18週（5月3日）までの報告数

麻しんとは

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。

- ヒトからヒトへ感染が伝播し、感染力が極めて強く、空気感染、飛沫感染、接触感染で容易に広まります。
- 免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、また、一度感染して発症すると、一生免疫が持続すると言われています。
- 感染すると10日程度の潜伏期の後、38℃台の発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。
- 2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが現れます。
- 肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

[厚生労働省ホームページ「麻しん」](#) <外部リンク>

[国立健康危機管理研究機構ホームページ「麻しん」](#) <外部リンク> <外部リンク>

## 県民の皆様へのお願い

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。

- 麻しんの予防には、予防接種が最も有効であり、十分な効果を期待するためには2回の接種が必要です。
- 定期予防接種の対象者の方は、対象年齢になったら、早めに接種しましょう。
- 発熱、発しんなどの麻しんを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話連絡の上、指示に従って受診してください。

### <定期接種の対象年齢>

第1期：1歳以上2歳未満（生後12月から生後24月に至る間にある方）

第2期：5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間

※新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種時期に定期接種を行えず接種を延期されていた方が、その後（規定の接種時期ではない時期）に接種を行った場合についても、定期接種として取り扱われ得ます。お住まいの市町村にお問い合わせください。

### <任意接種について>

定期接種の対象でない方が予防接種を希望される場合は、ご希望の医療機関に、麻しんの予防接種（MRワクチン等）が可能かお問い合わせください。

### <参考 リーフレット>

[麻しんはワクチン接種が予防に有効です！\[PDFファイル/82KB\]](#)

[100万回のハグよりも、2回のワクチンを。\[PDFファイル/480KB\]](#)



PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Reader®が必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。（無料）

## このページに関するお問い合わせ

[福祉保健部 感染症対策・薬務課](#)

感染症対策班

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階

Tel：025-280-5200 Fax：025-280-5641 [メールでのお問い合わせはこちら](#)

[ポスト](#)

[県公式SNS一覧へ](#)

**新潟県庁** 法人番号 5000020150002

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

電話番号：025-285-5511（代表） 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く

[県庁へのアクセス](#)

[県庁舎のご案内](#)

[直通電話番号一覧](#)

[メンテナンス](#)

手話で電話する

[サイトマップ](#)

[ガイドライン](#)

[個人情報の取扱い](#)

[免責事項](#)

[RSS配信について](#)

[リンク集](#)

PCサイト表示

スマホサイト表示

## 麻しんの感染拡大防止に向けた国民の皆様へのメッセージ

- 重症になりやすく、感染力が極めて高い麻しん（はしか）が、2020年以降最多となるペースで感染拡大しています。麻しん（はしか）は、マスクや手洗いでは感染予防として十分ではなく、ワクチンが重要です。**麻しん（はしか）は、「かかってもたいしたことはない」感染症ではなく、肺炎・脳炎・腸炎などで重症化することも多く、先進国でも重症化することもあり、1,000人に1人死亡するとされている感染症**です。更なる感染拡大防止のため、以下の事項について、ご協力をお願いいたします。

### <麻しん（はしか）を疑う症状がある場合の対応>

- **麻しんを疑う症状がある場合は、外出を控える**とともに、**受診する場合には、事前に医療機関に連絡の上、医療機関の指示に従ってご対応いただく**ようお願いいたします。
- 感染拡大防止のため、受診の際には、**公共交通機関の利用を可能な限り避ける**ことについて、ご協力をお願いいたします。

### <自治体の疫学調査へのご協力>

- 麻しん（はしか）の感染拡大防止には、**患者や接触者に対する行政による調査が重要**です。ご協力をお願いいたします。

### <ワクチン接種のご検討>

- ご自身の発症予防、重症化予防、集団としての感染拡大防止の観点から、ワクチンは2回接種することが重要です。
- お子様は麻しん・風しんワクチンの**定期接種の対象である1歳又は就学前1年間**にある場合、**積極的に早期の接種をご検討**ください。
- 海外では大きな流行が複数の国で報告されています。接種が不十分な場合、**渡航の2週間前までに接種することをご検討**ください。
- **2000年4月1日以前に生まれた方は、当時の感染状況もあり、2回の定期接種が行われていない可能性があります。**母子健康手帳等で、過去の麻しんの罹患歴又は2回の接種記録を確認できない方は、今一度、**麻しん・風しんワクチンの接種をご検討**ください。なお、今回の流行は**10代～40代の方を中心に流行している**ことも踏まえ、特にこの年齢層の方はご検討をお願いいたします。

### <特にご注意いただきたい方々>

- 特に、以下の方々は、接種が不十分な場合、ワクチンの接種をご検討ください。
  - ・ 保育園や学校職員、医療機関職員など、小さいお子さんや患者さんと接触する機会の多い方
  - ・ 空港職員、観光業スタッフなど渡航者と接触する機会の多い方
- また、以下の方々は、感染すると重症化すると言われておりますのでご注意ください。
  - ・ 妊娠中は麻しん風しんワクチンの接種はできません。早産や流産のリスクがあるため、妊娠前の接種をご検討ください。
  - ・ 免疫不全のある方は、主治医の方と相談のうえ、麻しん風しんワクチン接種をご検討ください。
  - ・ 乳幼児は、肺炎や脳炎を起こすリスクがありますので、ご家族の接種歴をご確認ください。

## つつが虫病について

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課

### 1 つつが虫病とは

- つつが虫病は、細菌の一種であるリケッチアによる感染症です。北海道を除く全国で発生が見られ、春～初夏及び秋～初冬に2つの発生ピークがあります。また、東南アジア等にも広く存在しており、輸入感染症としても注意が必要です。
- 本疾患は、リケッチアを保有したツツガムシ（ダニの一種）に刺されることによって感染します。人から人へ感染することはありません。
- 典型的には、5～14日の潜伏期の後に、全身倦怠感、食欲不振とともに頭痛、悪寒、発熱などの症状が現れます。数日後より、体幹部を中心に発しんが現れ、リンパ節の腫れを伴うこともあります。

### 2 対応・予防方法

- 抗菌薬による治療を行います。通常、抗菌薬が速やかに効きますが、治療が遅れると重症化する場合があるので、早期発見・早期治療が重要です。
- 野外作業、山菜採り、アウトドアレジャーなどで山林や草地などに入る際は、病原体を保有するダニに刺されることによって、つつが虫病などのダニ媒介感染症に感染する可能性がありますので、次のことに注意しましょう。
  - (1) 長袖、長ズボン、長靴を着用し、肌をできるだけ出さないようにする。
  - (2) 衣類を草むらに置かず、草むらでの休息を控える。
  - (3) 防虫スプレーを使用する。
  - (4) 山野での作業後は入浴するなどして、吸血前のダニを皮膚から洗い流す。
  - (5) ダニが体についていないか確認する。
    - ・ダニに刺されている場合は早期に除去することが重要です。早ければ病原体が体内に注入することを防げる場合もあります。
    - ・自分でダニの体をつまんで引き抜こうとすると、病原体を自分の体内に注入してしまうことや、ダニの頭部が皮膚に残ってしまうことがあるので、皮膚科で除去してもらうことをお勧めします。

### 3 その他の主なダニ媒介感染症

- 日本紅斑熱：日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニ【大きさ約3mm】に刺されて起こる感染症です。潜伏期は2～8日で、発熱、発疹を伴って発症します。
- SFTS：SFTSウイルスを保有するマダニ【大きさ約3mm】に刺されて起こる感染症です。潜伏期は6日～2週間で、発熱、食欲低下、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などで重症化し、死亡することもあります。
- その他に、ライム病、回帰熱、ダニ媒介脳炎等があります。

### 4 届出状況

|                    |     | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| つつが虫病              | 新潟県 | 7    | 4    | 6    | 4    | 6    | 1    |
|                    | 全国  | 544  | 492  | 445  | 354  | 295  | 43   |
| 日本紅斑熱              | 新潟県 | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
|                    | 全国  | 490  | 457  | 500  | 523  | 675  | 37   |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 新潟県 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                    | 全国  | 110  | 118  | 134  | 122  | 191  | 29   |

※令和8年は新潟県が第19週（5月4日～5月10日）、全国が第18週（4月27日～5月3日）時点

【参考：啓発ツール・リーフレット等】

・厚生労働省ホームページ「ダニ媒介感染症」(<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html>)