

R8 岩船米生育速報No.6 (7月21日現在)

村上農業普及指導センター

～出穂期にかけての葉色の急激な低下に注意～

適正追肥と飽水管理の徹底で稲体の活力維持を！

生育概況

草丈：長い 茎数：多い 葉色：やや濃い～濃い

- 7月に入って高温（高夜温）気象が続き、草丈が長く、葉色が濃くなっている。
- 5月半ば頃までに移植されたコシヒカリは、幼穂形成期を過ぎており、出穂期は平年より3日程度早い見込み。

当面の管理のポイント

- 分施肥栽培では、葉色の推移等を観察し、生育診断に基づいた適正穂肥を実施しましょう。
- 全量基肥施肥栽培では、葉色の推移を観察し、SPAD値33以下になる場合は、出穂期10日前までに窒素成分で1.0kg/10aを目安に追肥を実施しましょう。
- 水管理は、稲体の活力を維持するため飽水管理を徹底しましょう。
（地域の用水事情に合わせた対応をお願いします）
- 葉いもちの発生が見られます。早期発見・早期防除に努めましょう。
- カメムシ類の発生が多くみられます。斑点米被害防止のため、畦畔の草刈りと出穂後の薬剤防除を徹底しましょう。

用水は、かけ流しにならないよう、止め忘れを防ぎ、大切に使いましょう
暑い日が続きますが、こまめに休息と水分をとり、熱中症に注意しましょう

【コシヒカリ】（*印は全量基肥施肥栽培）

調査場所	田植日	草丈(cm, %)			茎数(本/㎡, %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)			出穂予想
		本年	平年比	前年比	本年	平年比	前年比	本年	平年差	前年差	本年	平年差	前年差	
山北* (大毎)	5/10	88	115%	108%	428	104%	100%	13.2	1.8	1.6	34.3	-0.1	-1.5	8/6
朝日* (川端)	5/10	77	100%	105%	472	103%	137%	12.5	0.3	0.2	34.2	1.8	6.6	8/8
村上* (鑄物師)	5/10	78	101%	93%	498	117%	107%	12.4	0.4	0.1	35.8	-1.4	-0.5	8/3
神林 (牛屋)	5/10	82	106%	104%	486	121%	133%	13.0	0.9	0.8	35.0	3.1	6.1	8/2
荒川 (名割)	5/15	77	97%	108%	441	104%	108%	11.3	-0.2	0.6	39.5	1.3	5.6	8/11
関川 (下関)	5/15	79	105%	107%	517	120%	126%	12.3	0.6	0.5	42.5	4.6	10.4	8/10

6地点平均	田植日	草丈(cm, %)			茎数(本/㎡, %)			葉数(葉)			葉色(SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
	5/11	80	114%	104%	474	122%	119%	12.5	1.0	0.6	36.9	4.4	4.5

問い合わせ先: 村上農業普及指導センター

TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp