

気 候 変 動 を 意 識 し た コ ン パ ク ト で 丈 夫 な 稲 づ く り

葉色低下ほ場では追加穂肥を！

1 葉色の状況（葉色：SPAD 値）

○コシヒカリの葉色は、穂肥の施用等により「並」を維持しています。

○新之助の葉色は、「濃い」状況です。

品 種		7 月 27 日	7 月 21 日	7 月 8 日	出穂期 (見込)
コシヒカリ (調査点数7)	本年値	34.4	34.6	35.0	7/30
	指標比	並	並	淡	
新之助 (調査点数4)	本年値	36.0	36.7	35.1	8/9
	指標比	濃	濃	並	



2 追加穂肥について

(1) コシヒカリ

分施肥体系・基肥一発体系ともに、出穂期の葉色が32～33（SPAD 値）を下回るほ場については、ただちに窒素成分 1.0～1.5 kg/10 a の追加穂肥を実施する。

出穂期直前！速やかに葉色確認を！

(2) 新之助

2回目穂肥については、出穂期 10 日前に窒素成分 1.0kg/10a をめやすに施用する。栄養凋落が予想される場合は、窒素成分 1.5kg/10a を上限に施用量を調整する。

詳しい技術情報については、
稲作技術情報もご覧ください→



～農作業時は熱中症対策をきちんと行いましょう～

農業者向け熱中症対策はこちら→

