

○出穂は早生品種で平年より 3 日早まる見込み、コシヒカリで平年より 2 日早まる見込みです。

○コシヒカリの 1 回目穂肥時期は平年より早まる見込みです。葉色を確認し、遅れずに施用しましょう。

○葉月みのり、ゆきみらいは 2 回目の穂肥時期です。後期栄養の維持のため、確実に施用しましょう。

○こしいぶきは 1 回目穂肥時期です。遅れずに施用しましょう。

○梅雨入り以降、葉いもちが発生しやすい状況が続いています。ほ場をよく見回り、発生がみられたら防除を行いましょう。

1 現在の生育状況（6月30日データ）

(調査地区平均)

	草丈 (cm)		茎数 (本/m ²)		葉数 (葉)		葉色 (SPAD)	
	本年	指標値比 (指標値)	本年	指標値比 (指標値)	本年	指標値差 (指標値)	本年	指標値差 (指標値)
コシヒカリ	56	104% (54)	489	102% (480)	10.0	0.2 (9.8)	36.7	-1.3 (38.0)
こしいぶき	60	113% (53)	486	93% (520)	10.9	1.0 (9.9)	40.8	0.8 (40.0)
新 之 助	44	110% (40)	522	92% (570)	10.2	0.2 (10.0)	39.0	3.0 (36.0)

- ・コシヒカリ：草丈「並」 茎数「並」 葉数「並」 葉色「やや淡」
 - ・こしいぶき：草丈「長い」 茎数「やや少」 葉数「早い」 葉色「並」
 - ・新 之 助：草丈「長い」 茎数「やや少」 葉数「並」 葉色「濃い」
- ・中干しは出穂1か月前までに終了しましょう。幼穂の伸長には水が必要です。間断かん水に移行し、うわ根を健全に維持しましょう。

2 出穂期予想と穂肥施用時期の目安（6月30日現在）

品種名	田植日 (例)	予想 出穂日	穂肥 1 回目		穂肥2回目	
			出穂前日数	施用時期	出穂前日数	施用時期
こしいぶき	5月5日	7月20日	2 3	6月27日	1 4	7月6日
コシヒカリ	5月10日	8月 1 日	1 8	7月14日	1 0	7月22日
新 之 助	5月13日	8月9日	1 8	7月22日	1 0	7月30日

- ・分施の場合は、必ず幼穂長を確認し施用時期に遅れないように湛水して穂肥を施用しましょう。
- また、2回目の穂肥は、後期栄養を維持し、品質低下を回避するために必ず施用しましょう。

3 穂肥施用量の目安

品 種	資材例（窒素成分）	1 回目 (kg/10a)	2 回目 (kg/10a)
こしいぶき	穂肥 520 号 (15%)	10 (N 1.5)	13 (N 2.0)
コシヒカリ	越後の輝き有機50穂肥 (12%)	8 ～ 12 (N 1.0 ～ 1.5)	8 ～ 16 (N 1.0 ～ 2.0)
新 之 助	越後の輝き有機50穂肥 (12%)	4 ～ 12 (N 0.5 ～ 1.5)	4 ～ 12 (N 0.5 ～ 1.5)


◎ 基肥一発体系は必ず1回目穂肥時期に稲姿を確認し、目安（SPAD値：32、葉色板：3.9）以下の葉色にさめた場合は、基肥一発体系であっても穂肥施用を検討しましょう。

4 生育診断

【幼穂長と出穂前日数の目安】

幼穂長 (cm)	0.1	0.2~0.4	0.5~1.0	4 ~ 6	8 ~ 11
出穂前日数	23日	20日	18日	12日	10日


〈幼穂長の確認方法〉



5 倒伏リスク低減のためのコシヒカリ 1 回目穂肥量の調節

判断時期：出穂 20 日前（幼穂長 0.2～0.4cm 時）

生育量 早見グラフのエリア	幼穂伸長期間（出穂 23 日前～10 日前）の気象予報別の穂肥対応		
	低温・少照・多雨	平年並	高温・多照・少雨
A	○△倒伏が心配される場合は、穂肥時期を遅らせ、量を控えめに！	◎出穂 18 日前に基準量	◎出穂 18 日前に基準量
B	×施用しない	×施用しない	○出穂 15 日前に基準量
C	×施用しない	×施用しない	×△施用しない。ただし、異常高温の場合は、早急に基準量



草丈と葉色を測り、上下の表を見比べて、生育量が A、B、C どのエリアにいるか確認し、適切な穂肥対応をしましょう！

6 斑点米カメムシ類対策

○斑点米カメムシ類が増加することが予想されます！

〈多発条件〉


- ・夏場の気温が高い場合
- ・畦畔・農道や水田内の雑草の放置

〈対策〉

- ★適期の薬剤防除（出穂期 3 日後～出穂期 7 日後）
- ★出穂期 10 日前までに畦畔の除草を徹底する
- ★水田内の雑草を発生させない

畦畔のイネ科雑草が繁茂する時期にカメムシも増加

令和 7 年新潟県内のアカスジカスミカメの発生推移
(引用：新潟県病害虫防除所)



◎ SNS・メールで情報提供しています！

〈JA えちご中越柏崎地域営農情報〉



アカウント ID：@882qbimy



〈柏崎農業普及指導センター 稲作メールマガジン〉



↑詳細はこちらから

ngt111840@pref.niigata.lg.jp

- こちらのアドレスに、
- ①件名は「稲作メールマガジン申込」
- ②本文に「氏名」、「電話番号」を記入の上、送信してください。

柏崎地域農業振興協議会

柏崎市、刈羽村、新潟県農業共済組合中越支所、えちご中越農業協同組合、柏崎土地改良区
柏崎農業普及指導センター（新潟県柏崎地域振興局農業振興部）

【お問い合わせ先】

全地区共通

柏崎農業普及指導センター 21-6263
JA えちご中越柏崎地区センター
農政企画課 21-0220

東部田尻・西中通・高柳

かしわざき営農センター 35-8188

南部高田・中央柏崎地区

かしわざき南部営農センター 41-6087

刈羽・西山地区

かしわざき北部営農センター 45-2258