

BLASTAM によるいもち病感染好適条件の判定結果 (R8)

(7月29日まで)

[illegible]

	上越						魚沼					中越				新潟				下越				佐渡			
	糸魚川	能生	関山	高田	大潟	安塚	湯沢	津南	十日町	小出	守門	柏崎	長岡	三条	寺泊	巻	新津	新潟	津川	中条	下関	村上	粟島	羽茂	相川	両津	弾崎
7月1日																										?	
7月2日			●	●	●				④	④	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●			
7月3日			●	●	●	●	●	④	●	●	●	●	●	●					④		④		●				●
7月4日																	●										
7月5日																											
7月6日			●	●	●	●		●	●		④	●	●	●	●	●			●					●			
7月7日																			●	●							
7月8日																											
7月9日																											
7月10日																											
7月11日																											
7月12日																				③	②	②	②		②		
7月13日									②	②			③	③	②									③			
7月14日																			③								
7月15日																											
7月16日													③								③						
7月17日														?													
7月18日		②					②	②												③							
7月19日						②							③														
7月20日																											
7月21日																											
7月22日																											
7月23日											③																
7月24日																			②								
7月25日									③		③			③	③		③										
7月26日																			②								
7月27日				②	②							②				?											
7月28日																											
7月29日																											
7月30日																											
7月31日																											

【コード 一覧】

- : 好適条件(湿潤時間が長く気温も適当で、いもち病発生的好適条件が現れた)
- ① : 準好適条件(前5日間の平均気温は20℃未満だが、湿潤が10時間以上)
- ② : 準好適条件(前5日間の平均気温は25℃を越えているが、湿潤が10時間以上)
- ③ : 準好適条件(湿潤時間中の平均気温は15～25℃でないが、湿潤が10時間以上)
- ④ : 準好適条件(湿潤時間中の気温は比較的低いが、湿潤が10時間以上)
- 空欄 : 好適条件なし(いもち病発生的好適条件は現れなかった)
- ? : 判定不能(データが無いまたは欠測があり、いもち病発生的好適条件の判定はできない)

※ 準好適条件の①～④については、条件を区分した整理番号であり、
あえて感染しやすさに順序を付けるとすると、●＞①≧②＞③≧④となる。