

R8 岩船米生育速報No.8 (7月30日現在)

村上農業普及指導センター

追加穂肥と丁寧な水管理で8月の高温に備えよう！

～出穂期にかけての葉色低下に要注意～

コシヒカリの生育概況

草丈：長い 茎数：多い 葉色：並～やや濃い

○降雨続き（日照不足）で草丈が伸び、葉色は濃くなっています。

○コシヒカリの出穂が各地で確認され始めています。

当面の管理ポイント

○8月はかなりの高温が続くと予想されています。栄養不足による稲体の消耗や品質低下を避けるため、葉色の淡い場合は追加穂肥を確実に実施しましょう。

○分施肥栽培で、出穂期6日～3日前に葉色（SPAD値）が31以下の場合は、出穂期3日前までに追肥（窒素成分で1kg/10a以内）を実施しましょう。

○全量基肥施肥栽培で、出穂期の葉色（SPAD値）が33を下回ることが予想される場合は、出穂期3日前までに追肥（窒素成分で1kg/10a以内）を実施しましょう。

○出穂前後は水を最も必要とする時期です。地域の用水事情に合わせてかん水を行い、出穂期25日後頃まで飽水管理を継続しましょう。

○フェーンや異常高温が予想される場合は、早めにかん水して、被害軽減に努めましょう。

○7月29日に斑点米カメムシ類の多発生に関する注意報が出されました。

【コシヒカリ】（*印は全量基肥施肥栽培）

調査場所	田植日	草丈 (cm, %)			茎数 (本/㎡, %)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)			調査ほ場の予想出穂期
		本年	平年比	前年比	本年	平年比	前年比	本年	平年差	前年差	本年	平年比	前年差	
山北* (大毎)	5/10	102	117%	106%	409	108%	110%	13.6	1.1	0.5	34.2	3.7	5.0	8/4
朝日* (川端)	5/10	88	100%	101%	459	112%	146%	13.5	0.1	-0.4	32.6	2.4	3.1	8/7
村上* (鑄物師)	5/10	100	111%	102%	434	108%	100%	12.7	-0.5	-1.3	36.3	1.9	3.6	7/30
神林 (牛屋)	5/10	102	113%	99%	471	123%	129%	13.0	-0.3	-0.3	37.2	4.2	3.5	7/31
荒川 (名割)	5/15	91	102%	107%	374	100%	102%	12.5	-0.3	0.1	35.0	1.6	6.6	8/11
関川 (下関)	5/15	101	113%	111%	459	117%	114%	12.9	-0.1	-0.7	39.6	6.5	9.9	8/10

6地点平均	田植日	草丈 (cm, %)			茎数 (本/㎡, %)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差
	5/11	97	120%	104%	434	121%	117%	13.0	0.8	-0.4	35.8	2.3	5.3

用水は、かけ流しにならないよう、止め忘れを防ぎ、大切に使いましょう
暑い日が続きますが、こまめに休息と水分をとり、熱中症に注意しましょう

問い合わせ先：村上農業普及指導センター

TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp