

		1100 - 1200℃		中生		晩生		コシヒカリ、こがねもち		1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	
出穂期										1,000℃		950℃	

収穫適期の 出穂後積算

凡例	925 - 950℃
	950 - 1000℃
	1000 - 1050℃
	1050 - 1100℃
	1100 - 1200℃

	品種名	収穫適期の出現後極算気温 通常年	高温豊熟年
早熟	新潟次郎	1,000℃	
	ゆきみらい、こしひぶき、わたぼうし、五百万石	975℃	925℃
	ゆきん子爵	950-1,000℃	900-950℃
	ちほみのり	1,050-1,200℃	
	つどあかり	1,100-1,200℃	
中生	トシヒカリ、こねがもち	1,000℃	950℃
	越後栗	1,000-1,050℃	950-1,000℃
晩生	新之助、あやだわら	1,050-1,100℃	1,000-1,050℃

- ①出穂期を確認(例:8月3日の場合)
- ②積算気温を確認(1,000度の位置を確認)
- ③収穫期(成熟期)を推定(9月14日)
- ④ほ場で籾の黄化程度を確認する

348	322	297	272	247	221	196	172
372	346	321	296	271	246	221	196
396	370	345	320	295	270	245	220
420	394	369	344	319	293	268	244
444	418	393	368	342	317	292	267
467	442	417	391	366	341	316	291
491	465	440	415	390	365	340	315