

# 十日町地域 稲作速報～収穫情報～（8/18 発行）

十日町農業普及指導センター・十日町地域農業振興協議会魚沼米振興部会

- 向こう1か月は気温の高い状態が続くため、収穫期が早まる見込みです。
- 収穫適期は、ほ場ごとに籾の黄化率を確認して判断しましょう。
- 同一品種の作付割合の高い大規模経営体では、収穫適期より早めに収穫作業を開始し、刈り遅れを防ぎましょう。

【気象予報】北陸地方の1か月予報（新潟地方気象台8月13日発表）

| 気温 | 降水量     | 日照時間   |
|----|---------|--------|
| 高い | 平年並か少ない | 平年並か多い |

【収穫適期のめやす】（8月18日現在）


| 移植時期  | 品種                    | 積算温度             | 出穂期<br>(例) | 収穫適期のめやす※1 |       |
|-------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------|
|       |                       | 通常               |            | 十日町        | 津南    |
| 5月中旬植 | 五百万石                  | 975℃             | 7月16日      | 8月23日      | 8月25日 |
|       | つきあかり                 | 1,100℃           | 7月19日      | 9月1日       | 9月3日  |
|       | こがねもち                 | 1,000℃           | 7月22日      | 8月31日      | 9月2日  |
|       | コシヒカリ<br>(標高100～200m) | 1,000℃           | 7月30日      | 9月9日       |       |
| 5月下旬植 | コシヒカリ<br>(標高300～500m) | 1,000℃           | 8月5日       | 9月19日      |       |
|       | にじのきらめき               | 1,100～<br>1,200℃ | 8月9日       | 9月27日      | 9月30日 |
|       | 新之助                   | 1,050℃           | 8月11日      | 9月27日      | 9月30日 |

※1 十日町は標高170m、津南は標高452mの気温により算出。コシヒカリ(標高100～200m)は標高170m、コシヒカリ(標高300～500m)は標高452mの気温により算出。

※2 積算温度による収穫適期はめやすです。高温で推移した場合は50℃（2日程度）早くなります。

※3 生育ボリューム、葉色、地力、標高等により適期は異なりますので、必ずほ場で籾の黄化率を確認しましょう。収穫適期は黄化籾の割合が85～90%になった頃です(右図)。

※4 積算温度表は毎週火曜日に更新しています。



十日町農業普及指導センター（作物担当）

TEL 025-757-5516・6061

HP [http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi\\_nogyo/suito.html](http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi_nogyo/suito.html)



←LINE 水稻情報は  
こちらから

こまめな休憩と水分補給で  
熱中症を予防しましょう！