

コシヒカリの収穫早まる！ 刈遅れに注意！！

【収穫】

- ・コシヒカリの出穂期が早まったため収穫適期も早まります。適期収穫に努めましょう。
- ・収穫適期は、積算気温を参考に必ずほ場ごとに籾を確認し、黄化籾割合85%～90%に達したら刈り取りを始めましょう。（稲作情報 No.10 参照）
- ・刈遅れによる胴割米の発生に注意しましょう。

【乾燥・調製】

- ・乾燥温度や乾燥速度に注意し、適正な乾燥作業で胴割米の発生を防止しましょう。
- ・水分バラツキの多い籾は、乾燥水分18%～20%で2段乾燥（一旦停止し半日程度貯留して水分ムラを解消し再乾燥）しましょう。
- ・品質低下が懸念され、色彩選別機を利用可能な場合は積極的に活用し整粒歩合を高めましょう。
- ・青未熟粒が多い年は水分が戻る場合があります。乾燥後の水分変化に注意しましょう。

【土づくり】

- ・ワキの発生防止のためにも、稲わらは秋にすき込みし、10月中旬までに完了しましょう。
- ・籾がらも積極的に施用し、ケイ酸を供給しましょう。

【出穂期からの積算気温を参考に、収穫適期の判断を】

表 品種別出穂期と収穫適期の予想（8/19 現在）

品種名	出穂期(出穂期の幅)	積算気温	収穫適期のめやす
コシヒカリ	7月26日(7/23～8/3)	950℃(※)	8月30日(8/26～9/7)

※収穫適期の積算気温は高温登熟年のため50℃（2日程度）早めている

- ・積算気温表や過去の稲作情報は、右記 QR コード先のホームページに掲載しております。

（普及指導センターホームページ：

<https://www.pref.niigata.lg.jp/site/fukyu-top/>）



【1か月予報（8/15～9/14）新潟地方気象台発表】

向こう1か月の気温は高いでしょう。

平均気温は、高い確率70%です。

**暑さが続いています。農作業中の熱中症に注意しましょう。
適宜休憩をはさみ、農作業事故に注意しましょう。**

【収穫・乾燥・調製機器について】

(1) コンバイン

- ・Vベルトやチェーンの点検をする際は必ずエンジンを停止して行いましょう。
- ・倒伏したほ場では、詰まりを防ぐため、刈り取り方向と刈り取り速度に注意しましょう。

(2) 乾燥機 注1

- ・張り込み前に掃除口・排風ダクト・排出スロワ（ハイコン・ヨココン）・点火・水分計の点検を行いましょう。
- ・時間当たりの乾減水分は0.8%を超えないように設定と調整をしましょう。
- ・胴割米の発生が懸念される場合は、時間当たりの乾減水分は **0.5%以下**にしましょう。
- ・乾燥後の水分確認は、検査を受けた水分計で行いましょう。乾燥機の水分計だけに任せないようにしましょう。

(3) もみすり機 注1

- ・使用前にはゴムロール（インペラ式もみすり機の場合はだっぷファンのライナー）の点検を行いましょう。
- ・ゴムロールやライナーは摩耗の程度や硬化の度合を確認し、必要に応じて交換しましょう。

(4) 計量機

- ・選別網の交換はマニュアルに従って確実に行いましょう。
- ・電子計りは水平を確認し、空の状態で0になるか確認しましょう。
- ・電子計りは基準分銅を使うなどの点検をしましょう。

(5) 色彩選別機 注1

- ・光源付近には塵や埃のないように使用頻度に応じて清掃しましょう。

注1 三相交流（200V）を電源にしている機械はモーターの回転方向の確認をしましょう。

令和8年度 出穂後の積算気温による収穫適期のめやす (8月19日 時点の予想)

8月18日 までの気温は本年値(長岡アメダスデータ)

8月19日 からの2週間は平年値+0.6～ +2.2℃、それ以降は平年値 + 0.6℃ の予測値(気象庁「向こう2週間・1か月の予測資料」)に基づいて算出

長岡普及指導センター

		8月												9月																																					
品種別の出穂期	出穂\収穫	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	日平均気温	28.8	27.8	27.5	26.7	26.4	26.3	26.4	26.7	26.8	26.8	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7	26.8	26.8	25.1	24.9	24.8	24.6	24.4	24.3	24.1	23.9	23.7	22.9	22.7	22.4	22.2	22.0	21.8	21.5	21.3	21.1	20.8	20.6	20.4	20.2	19.9	19.7	19.6	19.4	19.2	19.0					
コシヒカリ★	7月21日	798	826	853	880	906	933	959	986	1013	1039	1066	1093	1120	1146	1173	1200	1225	1250																																
	7月22日		796	824	851	877	903	930	956	983	1010	1037	1063	1090	1117	1144	1170	1195	1220	1245																															
	7月23日			794	821	847	874	900	927	954	980	1007	1034	1061	1087	1114	1141	1166	1191	1216	1240																														
	7月24日					819	845	871	898	925	952	979	1005	1032	1059	1085	1112	1137	1162	1187	1212	1236																													
	7月25日						817	843	870	896	923	950	977	1003	1030	1057	1084	1109	1134	1158	1183	1207	1232																												
	7月26日							815	842	869	896	922	949	976	1002	1029	1056	1081	1106	1131	1155	1180	1204	1228																											
	7月27日								817	844	871	898	924	951	978	1004	1031	1056	1081	1106	1131	1155	1179	1203	1227																										
7月28日									818	844	871	898	925	951	978	1005	1030	1055	1080	1104	1129	1153	1177	1201	1225																										
7月29日										819	846	873	899	926	953	980	1005	1030	1054	1079	1103	1128	1152	1176	1199	1222																									
7月30日										794	820	847	874	900	927	954	979	1004	1029	1053	1078	1102	1126	1150	1174	1197	1219																								
7月31日											819	846	873	899	926	951	976	1001	1026	1050	1074	1098	1122	1146	1169	1192																									
新之助★	8月1日													818	845	872	899	924	949	973	998	1022	1047	1071	1095	1118	1141	1164																							
	8月2日														818	844	871	896	921	946	971	995	1019	1043	1067	1091	1114	1137	1159	1181	1203	1225																			
	8月3日															817	844	869	894	919	943	968	992	1016	1040	1064	1088	1109	1132	1154	1176	1198	1219																		
	8月4日																815	841	865	890	915	939	964	988	1012	1035	1058	1081	1103	1125	1147	1169	1191	1212	1233																
	8月5日																	812	837	862	887	911	935	960	983	1007	1030	1053	1075	1097	1119	1141	1163	1184	1205	1226															
	8月6日																		809	834	859	883	907	931	955	979	1002	1025	1047	1069	1091	1113	1135	1156	1177	1198	1218														
	8月7日																			804	829	853	878	902	926	949	972	995	1017	1040	1062	1083	1105	1126	1147	1168	1189	1209	1229												
	8月8日																					823	847	871	895	919	942	965	987	1009	1031	1053	1075	1096	1117	1138	1158	1179	1199	121											
	8月9日																						820	844	868	891	914	937	959	981	1003	1025	1047	1068	1089	1110	1131	1151	1171	1191	1211										
	8月10日																							817	841	865	887	910	933	955	977	999	1020	1041	1062	1083	1104	1124	1144	1164	1184	1204	1223								
8月11日																								814	838	861	884	906	928	950	972	994	1015	1036	1057	1077	1098	1118	1138	1158	1177	1197	1216								
8月12日																									815	838	861	883	905	927	949	970	992	1013	1034	1054	1075	1095	1115	1134	1154	1173	1193	1212							
8月13日																													833	856	878	900	922	943	965	986	1006	1027	1047	1068	1088	1107	1127	1146	1165	1184					
8月14日																														829	852	874	895	917	938	959	980	1001	1021	1041	1061	1081	1100	1120	1139	1158					
8月15日																															824	846	868	889	911	932	953	973	994	1014	1034	1053	1073	1092	1112	1131					
8月16日																																819	841	862	883	905	925	946	966	987	1006	1026	1046	1065	1084	1103					
8月17日																																		827	848	869	890	910	930	950	970	990	1008	1028	1047						
8月18日																																			820	840	861	881	902	921	941	961	980	999	1018						
8月19日																																					833	854	874	894	913	933	952	972	991						
8月20日																																																			

※ ★ は、出穂盛期を表す

収穫適期のめやす

・収穫適期は、ほ場間で差があるので、実際の収穫は黄化初割合(85～90%)を確認して

・出穂後5～24日(20日間)の平均気温の平均が26.2℃以上の場合は、高温登熟年として

収穫適期のめやすを通常年より出穂後積算気温で50℃早めている。

※の品種:高温登熟確定

※※の品種:高温登熟の可能性大

品種名	出穂期(暫定)	収穫適期のめやす (出穂後積算気温)
なつひめ	(左表を参照)	1000℃
※ゆきみらい・こしいぶき・五百万石・わたぼうし		925℃
※ゆきん子舞		900～950℃
※つまあかり		1050～1150℃
※※コシヒカリ・こがねもち		950℃
※※新之助		1000～1050℃

注意: つまあかりの収穫適期の積算気温について、栽培指針では1000～1100℃となっているが、最新の研究結果によると、成熟期前後の品質特性として、粉質化の進みが速く、出穂後積算気温1,000℃時点での青未熟粒の発生が10%以上となる。また、胴割粒が発生しやすく、出穂後積算気温の上昇に伴い、胴割粒が増加する傾向がある。これらのことから、収穫適期は幅が狭く、出穂後積算気温1,100～1,200℃となる。

(凡例)

- 900℃～
- 950℃～
- 1000℃～
- 1050℃～
- 1100℃～