令和８年度　刈取適期積算気温表（9月3日　現在）（本年値9月2日まで、農業気象メッシュデータ【三条市興野】の日平均気温を使用）

三条農業普及指導センター

出　穂　期（月/日）　（品種名の表示は管内の平均的な出穂期）

収穫適期（月/日）	日平均気温（℃）	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20
		ゆきん子舞			こしいぶき			こがねもち							コシヒカリ 5月連休植え				コシヒカリ 5月中旬植え					新之助 5月中旬植え					新之助 5月下旬植え								
21日	26.3	1030	1002	975	946																																
22日	26.5	1056	1029	1002	973	943	912	883	854	825	797	769	745	718	692	667	639	612	584	557	529	502	474	445	415	386	360	334	310	282	253	223	196	168	139	111	81
23日	26.9	1083	1056	1029	999	970	939																														
24日	29.3	1113	1085	1058	1029	999	969	939	910	882	853	825	801	774	749	723	695	668	640	613	586	558	530	501	471	443	416	390	366	338	309	280	252	224	196	167	138
25日	29.5			1087	1058	1028	998	969	939																												
8月 26日	28.0	1170	1142	1115	1086	1056	1026	997	967	939	911	883	858	832	806	780	753	726	698	671	643	615	588	559	529	500	473	447	424	395	366	337	310	282	253	224	195
27日	24.1					1081	1050	1021	991	963	935																										
28日	25.1	1219	1192	1165	1135	1106	1075	1046	1016	988	960	932	907	881	855	829	802	775	747	720	692	665	637	608	578	549	523	497	473	444	415	386	359	331	302	274	244
29日	20.8						1096	1067	1037	1009	981	953	928																								
30日	25.2	1265	1238	1211	1181	1152	1121	1092	1062	1034	1006	978	953	927	901	875	848	821	793	766	738	711	683	654	624	595	569	543	519	490	461	432	405	377	348	320	290
31日	27.2								1090	1061	1033	1005	981	954	928																						
1日	28.1	1321	1293	1266	1237	1207	1177	1147	1118	1090	1061	1033	1009	982	957	931	903	876	848	821	794	766	738	709	679	651	624	598	574	546	517	488	460	432	404	375	346
2日	27.6										1089	1061	1036	1010	984	958	931																				
3日	24.3	1372	1345	1318	1289	1259	1229	1199	1170	1141	1113	1085	1061	1034	1008	983	955	928	900	873	846	818	790	761	731	702	676	650	626	598	569	540	512	484	455	427	398
4日	23.8												1084	1058	1032	1006	979	952	924																		
5日	24.8	1421	1393			1307	1277	1248	1218	1190	1162	1134	1109	1083	1057	1031	1004	977	949	922	894	866	839	810	780	751	724	698	674	646	617	588	561	533	504	475	446
6日	25.9														1083	1057	1029	1003	975	947																	
7日	24.0	1471	1443			1357	1327	1297	1268	1240	1212	1184	1159	1133	1107	1081	1053	1027	999	971	944	916	889	860	830	801	774	748	724	696	667	638	610	582	554	525	496
8日	28.0																1081	1055	1027	999	972	944															
9日	27.7	1527	1499	1472	1443	1413	1383	1353	1324	1296	1267	1239	1215	1188	1163	1137	1109	1082	1054	1027	1000	972	944	915	885	857	830	804	780	752	723	694	666	638	610	581	552
10日	26.6																		1081	1054	1026	998	971	942													
11日	28.2	1583	1554	1527	1498	1468	1437	1409	1379	1350	1322	1294	1270	1243	1217	1192	1164	1137	1109	1082	1054	1027	999	970	940	911	885	859	835	807	778	748	721	693	664	636	606
12日	27.2																				1082	1054	1026	997	967	939											
13日	24.8	1														4	1214	1189	1161	1134	1106	1079	1051	1022	992	963	937	911	887	859	830	800	773	745	716	688	658
14日	24.8																						1076	1047	1017	988	961	935									
15日	24.6	1															3	1238	1211	1183	1156	1128	1100	1072	1041	1013	986	960	936	908	879	850	822	794	766	737	708
16日	24.5																							1096	1066	1037	1010	984	961	932							
17日	22.6	1														0	1312	1286	1258	1230	1203	1175	1148	1119	1088	1060	1033	1007	983	955	926	897	869	841	813	784	755
18日	22.1																									1082	1055	1029	1005	977	948						
19日	21.8	1														4	1358	1329	1302	1274	1247	1219	1191	1163	1132	1104	1077	1051	1027	999	970	941	913	885	857	828	799
20日	21.5																										1098	1072	1049	1020	991	962	935				
21日	21.1	1														6	1399	1372	1344	1317	1289	1262	1234	1205	1175	1146	1120	1094	1070	1041	1012	983	956	928	899	871	841
22日	20.8																												1091	1062	1033	1004	977	949			
23日	20.6	1														8	1440	1414	1386	1358	1331	1303	1276	1247	1216	1188	1161	1135	1111	1083	1054	1025	997	969	941	912	883
24日	20.3																														1074	1045	1018	990	961	932	
25日	20.1	1														8	1481	1454	1426	1399	1371	1343	1316	1287	1257	1228	1201	1175	1152	1123	1094	1065	1038	1010	981	952	923
26日	19.9																															1085	1058	1030	1001	972	943
27日	19.7	1														8	1520	1494	1466	1438	1411	1383	1356	1327	1296	1268	1241	1215	1191	1163	1134	1103	1077	1049	1021	992	963
28日	19.5																																1097	1069	1040	1012	982
29日	19.4	1														7	1559	1532	1505	1477	1450	1422	1394	1366	1335	1307	1280	1254	1230	1202	1173	1144	1116	1088	1060	1031	1002
30日	19.2																																		1079	1050	1021

925-950℃
950-975℃
975-1000℃
1000-1050℃
1050-1100℃

収穫適期のめやす

	品種名	収穫適期の出穂後積算気温	
		通常年	高温登熟年
極早生	なつひめ	1000-1100℃	-
極早生	新潟次郎（飼料用）	1000℃	-
早生	こしいぶき、わたぼうし、五百万石	975℃	-
早生	ゆきん子舞	950-1000℃	-
早生	ちほみのり	1050-1200℃	-
早生	つきあかり	1100-1200℃	-
中生	コシヒカリ	1000℃	950℃
中生	こがねもち	1000℃	-
晩生	新之助	1050-1100℃	1000-1050℃
晩生	あきだわら	1050-1100℃	-

コメント
■コシヒカリと新之助は、高温登熟年をめやすとする。
■地域やほ場により生育や出穂期、気温などが異なるため、籾の黄化割合を確認して判断