

令和8年度 刈取適期積算気温表（9月10日 現在）（本年値9月9日まで、農業気象メッシュデータ【三条市興野】の日平均気温を使用）

三条農業普及指導センター

収穫適期 (月/日)	日 平均 気温 (℃)	出 穂 期 (月/日) （品種名の表示は管内の平均的な出穂期）																																								
		こしいぶき										コシヒカリ 5月連休植え						コシヒカリ 5月中旬植え						新之助 5月中旬植え						新之助 5月下旬植え												
		ゆきん子舞					こがねもち																																			
		7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20					
8月	21日	26.3	1030	1002	975	946																																				
	22日	26.5	1056	1029	1002	973	943	912	883	854	825	797	769	745	718	692	667	639	612	584	557	529	502	474	445	415	386	360	334	310	282	253	223	196	168	139	111	81				
	23日	26.9	1083	1056	1029	999	970	939																																		
	24日	29.3	1113	1085	1058	1029	999	969	939	910	882	853	825	801	774	749	723	695	668	640	613	586	558	530	501	471	443	416	390	366	338	309	280	252	224	196	167	138				
	25日	29.5			1087	1058	1028	998	969	939																																
	26日	28.0	1170	1142	1115	1086	1056	1026	997	967	939	911	883	858	832	806	780	753	726	698	671	643	615	588	559	529	500	473	447	424	395	366	337	310	282	253	224	195				
	27日	24.1				1081	1050	1021	991	963	935																															
	28日	25.1	1219	1192	1165	1135	1106	1075	1046	1016	988	960	932	907	881	855	829	802	775	747	720	692	665	637	608	578	549	523	497	473	444	415	386	359	331	302	274	244				
	29日	20.8					1096	1067	1037	1009	981	953	928																													
	30日	25.2	1265	1238	1211	1181	1152	1122	1092	1062	1034	1006	978	953	927	901	875	848	821	793	766	738	711	683	654	624	595	569	543	519	490	461	432	405	377	348	320	290				
	31日	27.2								1090	1061	1033	1005	981	954	928																										
9月	1日	28.1	1321	1293	1266	1237	1207	1177	1147	1118	1090	1061	1033	1009	982	957	931	903	876	848	821	794	766	738	709	679	651	624	598	574	546	517	488	460	432	404	375	346				
	2日	27.6									1089	1061	1036	1010	984	958	931																									
	3日	24.0	1372	1344	1318	1288	1259	1228	1199	1169	1141	1113	1085	1060	1034	1008	982	955	928	900	873	845	817	790	761	731	702	675	649	626	597	568	539	512	484	455	426	397				
	4日	22.9			925-950℃								1083	1057	1031	1005	978	951																								
	5日	22.5	1418	1390		950-975℃		1274	1244	1215	1187	1158	1130	1106	1079	1054	1028	1000	973	945	918	891	863	835	806	776	748	721	695	671	643	614	585	557	529	501	472	443				
	6日	24.6				975-1000℃								1078	1052	1025	998	970	943																							
	7日	24.0	1466	1438		1000-1050℃	1253	1322	1293	1263	1235	1207	1179	1154	1128	1102	1076	1049	1022	994	967	939	911	884	855	825	796	769	743	720	691	662	633	606	578	549	520	491				
	8日	23.2				1050-1100℃										1100	1072	1045	1017	990	962	935																				
	9日	20.8	1510	1482	1456	1426	1397	1366	1337	1307	1279	1251	1223	1198	1172	1146	1120	1093	1066	1038	1011	983	955	928	900	869	840	813	787	764	735	706	677	650	622	593	564	535				
	10日	22.0																	1088	1060	1033	1005	978	950																		
	11日	21.2	1553	1526	1498	1470	1442	1416	1390	1363	1335	1307	1279	1251	1223	1195	1167	1139	1109	1081	1054	1026	999	971	942	912	883	857	831	807	779	750	720	693	665	636	608	578				
	12日	24.9	収穫適期のめやす																	1079	1051	1024	996	967	937																	
	13日	26.7	16				品種名		収穫適期の出穂後積算気温		15	1188	1161	1133	1106	1078	1050	1023	994	964	935	906							882	858	830	801	772	745	717	688	659	630				
	14日	24.6														1075	1047	1018	988	960	933																					
	15日	23.1	16				極早生	なつひめ	1000-1100℃	-	13	1235	1208	1180	1153	1126	1098	1070	1042	1011	983	956	930	906	878	849	820	792	764	736	707	678										
	16日	21.1						新潟次郎（飼料用）	1000℃	-	18	1280	1253	1225	1198	1171	1143	1115	1086	1056	1027	1001	975	951	927			923	894	865	837	809	780	752	723							
	17日	23.8	16					こしいぶき、わたぼうし、五百万石	975℃	-																																
	18日	25.7					早生	ゆきん子舞	950-1000℃	-	19	1332	1305	1277	1250	1222	1194	1167	1138	1108		1082	1053	1026	1000	977	948															
	19日	25.9	17					ちほみのり	1050-1200℃	-																																
	20日	22.1						つきあかり	1100-1200℃	-	13	1376	1349	1321	1294	1266	1238	1211	1182	1152	1123	1096	1070	1046	1018	989	960	933	905	876	847	818										
	21日	21.8	17				中生	コシヒカリ	1000℃	950℃														1092	1068	1040	1011	982	954	926												
	22日	21.6						こがねもち	1000℃	-	16	1419	1392	1364	1337	1309	1281	1254	1225	1195	1166	1139	1113	1090	1061	1032	1003	976	948	919	890	861										
	23日	21.6	18					晩生	新之助	1050-1100℃	1000-1050℃																1082	1053	1024	997	969	940										
	24日	20.8					あきだわら		1050-1100℃	-	18	1460	1433	1405	1378	1351	1323	1295	1266	1236	1207	1181	1155	1131	1103	1074	1045	1017	989	960	932	903										
	25日	20.5	18																								1094	1065	1037	1009	981	952										
	26日	20.2					コメント ■地域やほ場により生育や出穂期、気温などが異なるため、稲の黄化割合を確認して判断する。					14	1500	1473	1445	1418	1391	1363	1335	1306	1276	1248	1221	1195	1171	1143	1114	1085	1057	1029	1001	972	943									
	27日	19.9	19	1929	1902	1873						1843	1813	1783	1754	1725	1696	1670	1645	1618	1593	1567	1539	1512	1485	1457	1430	1402	1374	1346	1315	1287	1260	1234	1210	1182	1153	1124				
	28日	19.6																																								
	29日	19.5	19	1929	1902	1873						1843	1813	1783	1754	1725	1696	1670	1645	1618	1593	1567	1539	1512	1485	1457	1430	1402	1374	1346	1315	1287	1260	1234	1210	1182	1153	1124				
	30日	19.3																																								