４　参考文献

魚類相全般

越後生物調査研究会，2005．平成17年度農業農村環境情報整備調査委託事業報告書「加治川地区」．1-70.

北陸地方建設局阿賀野川工事事務所，2006．河川水辺の国勢調査　平成18年度　阿賀野水系（阿賀野川）魚介類調査報告書.

北陸地方建設局信濃川下流工事事務所，2002．河川水辺の国勢調査　平成14年度　信濃川水系（信濃川下流）魚介類調査報告書.

北陸地方建設局信濃川下流工事事務所，2007．河川水辺の国勢調査　平成19年度　信濃川水系（信濃川下流）魚介類調査報告書.

北陸地方建設局羽越工事事務所，2000．河川水辺の国勢調査　平成12年度　荒川水系（荒川）魚介類調査報告書.

北陸農政局農村計画部資源課，2005．平成16年度農業農村環境情報整備調査西蒲原地区報告書．1-93.

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所，2004．平成15年度国営土地改良事業地区調査新川流域地区環境調査（生物生息状況等）業務委託事業報告書（中間報告）．1-81.

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所，2008．平成19年度国営土地改良事業地区調査「加治川二期地区」環境調査（生物生息状況等）業務委託事業報告書．1-75.

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所，2011．平成22年度国営土地改良事業全体実施設計加治川二期地区環境配慮調査業務報告書（抜粋版）．1-40.

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所，2011．平成22年度国営土地改良事業地区調査新川流域二期地区他環境調査業務報告書（抜粋版）．1-16.

本間義治，1956．新潟県魚類目録補訂（Ⅳ）．魚類学雑誌，5：59-60.

本間義治，1957．佐渡島及びその周辺水域の動物相について－研究小史とその概観－．佐渡博物学会誌，(1)2：81-93.

本間義治，1995．新潟県魚類目録補訂(ⅩⅢ)．魚，43：11-28.

本間義治，2013．新潟県産魚類総目録．柏崎市立博物館館報，27：65-106.

本間義治･水沢六郎，1980．新潟県魚類目録補訂（Ⅹ）．日本生物地理学会会報，35(5)：49-60.

本間義治・水沢六郎・沖山宗雄，1972．新潟県魚類目録補訂（Ⅸ）．日本生物地理学会会報，28(4)：47-57.

本間義治・北見健彦・伊藤正一，1974．加茂湖（佐渡島）の動物相－予報．動物分類学会誌，10：63-73.

本間義治・中村幸弘・鶴田教明・井上信夫・本間　了，2002．新潟県魚類目録補訂（ⅩⅥ）．柏崎市立博物館館報，16：87-98.

池田哲夫・佐藤利夫，1981．民俗Ⅰ〈有形〉加茂湖の漁法と漁具．新潟県文化財調査年報第20 佐渡加茂湖-1981-：120-159.

伊藤正一，1981．生物Ⅰ加茂湖（佐渡島）の生物相－夏期安定成層後期の頃－．新潟県文化財調査年報第20 佐渡加茂湖-1981-：2-29.

伊藤正一，1988．３魚類.佐和田町史通史編Ⅰ，佐和田町教育委員会：155-164.

伊藤正一・本間義治・北見健彦，1982．加茂湖（佐渡島）の動物相続報Ⅰ．日本生物地理学会会報，(37)6：37-43.

上越市，2002．4章4節 魚類．上越市史　資料編　1自然，pp.363-398．東京法令出版株式会社，東京．
鹿野雄一（写真・文・デザイン）・中島淳・山下奉海・島谷幸宏（監修），2009．環境教育読本「水辺の生き物 in 佐渡ヶ島」．九州大学，福岡．28pp.
松本史郎・伊藤正一・佐藤　豊・本間義治，2007．2004年7月の大出水後における五十嵐川（信濃川支川）の陸水生物相　３．魚類．新潟県生物教育研究会誌，42：41-44.
松本史郎・伊藤正一・佐藤　豊・本間義治，2011．信濃川の４支川（加茂川・五十嵐川・刈谷田川・渋海川）における生物相の比較　３．魚類．新潟県生物教育研究会誌，46:25-28.
松本史郎・伊藤正一・佐藤　豊・本間義治，2014．新潟県北部３河川（蒲萄川・勝木川・大川）の陸水生物相　３．魚類．新潟県生物教育研究会誌，49： 印刷中 ．
松本史郎・伊藤正一・佐藤　豊・本間義治，2014．再度の出水で被災した信濃川下流域右岸３支川（刈谷田川・五十嵐川・加茂川）の陸水生物相　３．魚類．新潟県生物教育研究会誌，49：印刷中.
松本史郎・佐藤　豊・本間義治，2008．７．１３水害ならびに中越地震によって大被害を受けた刈谷田川ダム下流部の陸水生物相　４．魚類．新潟県生物教育研究会誌，43:29-32.
松本史郎・佐藤　豊・馬場吉弘・本間義治，2010．信濃川の一大支川渋海川の陸水生物ことに魚類の再生産を図る　３．魚類．新潟県生物教育研究会誌，45：51-54.
中坊徹次（編），2013．日本産魚類検索 全種の同定 第3版．東海大学出版会，東京.2428pp.
田中晋（編著），1993．とやまの川と湖の魚たち．シーエーピー，富山．289pp.
富樫繁春・帆苅信夫・松本史郎・伊藤正一・佐藤　豊・安部信之・帆苅　信・伊藤　章・本間義治，2009．下流景観をもつ小規模河川石川の生物相　１．岩船潟・石川の変遷過程並びに生物相の一端．新潟県生物教育研究会誌，44：45-50.
富山県，2012．6.5 淡水魚類．富山県の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブックとやま2002－，pp.88-106．富山スガキ株式会社，富山.

ニホンイトヨ

後藤　晃，2003．トゲウオ類からみた生物多様性と保全研究．後藤　晃・森　誠一編著，トゲウオの自然史【多様性の謎とその保全】，pp.233-249．北海道大学出版会，札幌.
樋口正仁，2003．日本列島周辺のイトヨ属魚類の遺伝的多様性と分化．後藤　晃・森　誠一編著，トゲウオの自然史【多様性の謎とその保全】,pp.49-60．北海道大学出版会，札幌.
Higuchi,M.・H.Sakai・A.Goto,2014.A new threespine stickleback, *Gasterosteus nipponicus* sp. nov. (Teleostei; Gasterosteidae) from Japan Sea region. Ichthyol. Res., 61：341-351.
酒井治己・宮内亮哉・竹田大地・樋口正仁・後藤　晃，2013．イトヨ*Gasterosteus aculeatus*日本海型と太平洋型の鱗板形態と分布．日本生物地理学会会報，68：57-63.

トミヨ属淡水型

高橋一彦・高田啓介，2003．トミヨ属魚類にみられる種間交雑とmtDNAの異種間浸透．後藤　晃・森　誠一編著，トゲウオの自然史【多様性の謎とその保全】，pp.102-113．北海道大学出版会，札幌.
中村幸弘，2006．新潟県におけるトミヨ属魚類の生息分布調査－まとめ．新潟県生物教育研究会誌，41：55-62.

ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種・広域分布種

Chiba,S.N.・R.Kakehashi・K.Sibukawa・T.Mukai・Y.Suzuki・N.Hanzawa, 2015. Geographical distribution and genetic diversity of *Gymnogobius* sp. ”Chokai-endemic species”(Perciformes:Gobiidae). Ichehyol.Res., 62：156-162.

向井貴彦・渋川浩一・篠崎敏彦・杉山秀樹・千葉 悟・半澤直人, 2010. ジュズカケハゼ種群：同胞種群とその現状. 魚類学雑誌, 57:173-176.

Sota,T.・T.Mukai・T.Shinozaki・H. Sato・K.Yodoe, 2005. Genetic differentation of the Gobies *Gymnogobius castaneus* and *G.taranetzi* in the region surrounding the Sea of Japan as inferred from a mitochondrial gene genealogy. Zool. Sci., 22：87-93.

クロヨシノボリ

井上信夫・松本史郎・本間義治, 1978. 新潟地方のヨシノボリ　－佐渡島における４型の分布. 動物分類学会誌, 15：60-69.

Oijen, M. J. P.・T.Suzuki・I-S.Chen, 2011. On the earliest published species of *Rhinogobius*. With a redescription of *Gobius brunneus* Temminck and Schlegel, 1845. Journal of the National Taiwan Museum, 64：1-17.

カワヤツメ・スナヤツメ

Yamazaki, Y.・A. Goto, 1996. Genetic differentiation of *Lethenteron reissneri* populations, with reference to the existence of discrete taxonomic entities. Ichthyol. Res., 43:283-299.

山崎祐治・後藤晃, 2000. ヤツメウナギ類における系統分類と種分化研究の現状と課題.魚類学雑誌, 47：1-28.

キタノアカヒレタビラ

Arai,R.・H.Fujikawa・Y.Nagata, 2007. Four new subspecies of *Acheilognathus bitterlings* (Cyprinidae: Acheilognathinae) from Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, Suppl., 1：11-28.

馬場吉弘, 2013. 上越産キタノアカヒレタビラの保全活動　－移植先の選定ならびに人工授精法の確立をめざして－. 第11回こしじ水と緑の会・朝日酒造自然保護助成基金　成果発表会　予稿集, 27-28.

ジュウサンウグイ

Sakai, H.・S. Amano, 2014. A new subspecies of anadromous far eastern Dace, *Tribolodon brandtii maruta* subsp. nov. (Teleostei, Cyprinidae) from Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, 40：219-229.

ウケクチウグイ

Doi, A.・H. Shinzawa, 2000. *Tribolodon nakamurai*, a new cyprinid fish from the middle part of Honshu Island, Japan. The Raffles Bulletin of Zoology, 48：241-247.

シナイモツゴ

朝倉瑞樹,2013.信濃川水系中越地域における絶滅危惧種シナイモツゴの保全生態学的研究. 第11回こしじ水と緑の会・朝日酒造自然保護助成基金　成果発表会　予稿集, 9-11.

石川訓子・坂井雅人・酒泉 満，2013．シナイモツゴの系統保存について．2013年東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会「水族館との共同研究。その現状と、将来展望に期待を込めて」要旨集，p.15.
石川訓子・坂井雅人・酒泉 満，2015．シナイモツゴの遺伝的系統解析．動物園水族館雑誌，56(1)：29.
加藤治彦・鶴巻博之・山田　篤・小川忠雄・鈴木倫明・渡邊精一 ，2003．シナイモツゴの遺伝的変異個体群と飼育下保存．動物園水族館雑誌，44：114.

ホトケドジョウ

Aiki,H・K.Takayama・T.Tamaru・N.Mano・M.Shimada・H.Komaki・H.Hirose,2009.Phylogeography of the Japanese eight-barbel loach *Lefua echigonia* from the Yamagata area of the Tohoku district, Japan. Fish. Sci., 75：903-908.
Jordan,D.S.・R.E.Richardson, 1907. On a collection of fishes from Echigo,Japan. Proceedings U.S.National Museum, 33：263-266.
Mihara,M.・T.Sakai・K.Nakao・L.O.Martins・K.Hosoya・J.Miyazaki, 2005. Phylogeography of Loaches of the genus *Lefua* (Balitoridae, Cypriniformes) inferred from mitochondrial DNA Sequences. Zool. Sci., 22：157-168.

カンキョウカジカ

樋口正仁・高田啓介・伊藤正一・井上信夫，2012．佐渡産カンキョウカジカの分布とmtDNAの塩基配列分析から見た遺伝的特徴.平成24年度日本水産学会春季大会講演要旨集,150.

カジカ中卵型・大卵型

Tsukagoshi.H.・R.Yokoyama・A.Goto, 2011. Mitochondrial DNA analysis reveals a unique population structure of the amphidromous sculpin *Cottus pollux* middle-egg type(Teleostei:Cottidae). Mol.Phylogent.Evol, 60：265-270.
Tsukagoshi. H.・K. Sakai, K.・Yamamoto & A. Goto, 2013. Non-indigenous amphidromous sculpin *Cottus pollux* small-egg type (Teleostei: Cottidae) detected in rivers entering the Sea of Japan off Honshu Island, Japan. Ichthyol. Res., 60：93-97.

キタノメダカ

Asai,T.・H. Senou・K. Hosoya, 2011. *Oryzias sakaizumii*, a new ricefish from northern Japan (Teleostei: Adrianichthyidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 22：289-299.
竹花佑介，2010．メダカの高精度系統地理マップをつくる．渡辺勝敏・高橋　博編著，淡水魚類地理の自然史【多様性と分化をめぐって】，pp.105-122．北海道大学出版会，札幌.

イドミミズハゼ

Honma,Y., 1991. A list of fishes found in the vicinity of Sado Marine Biological Station -Ⅶ. Report of the Sado Marine Biological Station Niigata Univercity. 11-35.
新潟大学理学部付属佐渡臨海実験所，1997．標本リスト．新潟大学理学部付属佐渡臨海実験所特別報告第７集，76.

アベハゼ

本間義治・中村幸弘・鶴田教明・井上信夫・本間了，2002．新潟県魚類目録補訂（ⅩⅥ）．柏崎市立博物館館報，16：86-98．

新潟県柏崎地域振興局，2008．平成20年度鵜川県単河川調査（一般）河川水辺の国勢調査委託報告書．1-206．

外来魚

中井克樹，2002．「ブラックバス問題」の現状と課題．日本魚類学会自然保護委員会編，川と湖沼の侵略者ブラックバス-その生物学と生態系への影響，pp. 127-147. 恒星社厚生閣，東京．

関谷伸一・本間義治，1975．新潟地方に産するテツギョの形態と倍数体．動物分類学会誌，11：53-60．

大型水生甲殻類全般

川井唯史・中田和義（編著），2011．エビ・カニ・ザリガニ　淡水甲殻類の保全と生物学．生物研究社，東京．460pp．

三宅貞祥，1998．原色日本大型甲殻類図鑑（Ⅱ）. 保育社，東京．261pp．

日本ベントス学会（編），2012．干潟の絶滅動物図鑑　海岸ベントスのレッドデータブック．東海大学出版会，神奈川．285pp．

豊田 幸詞・関 慎太郎，2014．ネイチャーウォッチングガイドブック 日本の淡水性エビ・カニ．誠文堂新光社，東京．256pp．

ヌカエビ

池田　実，1999．遺伝的に見たヌマエビの「種」．海洋と生物，123：229-307．

テナガエビ属

大野　淳，1999．テナガエビ属の種と地域個体群の分化．海洋と生物，123:319-329．